Cálculo 3A – EP10 – Teorema de Green. Teorema das quatro equivalências – Gabarito

Exercício 1: Calcule a integral de linha diretamente e, também, pelo teorema de Green:

$$\oint_C x\,dx + y^2\,dy$$

onde C é o caminho fechado formado por $y = x^2$ e $y = x$, no sentido anti-horário.

Solução: O esboço de $C = C_1 \cup C_2$ está representado na figura que se segue.



Cálculo direto

Temos que:

$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_{C_1} \vec{F}\cdot d\vec{r} + \int_{C_2} \vec{F}\cdot d\vec{r}$$

onde $\vec{F}(x,y) = \left(x, y^2\right)$. Temos que $C_1 : \gamma(t) = \left(t, t^2\right)$, com $0 \le t \le 1$. Logo, $\gamma'(t) = (1, 2t)$. Assim:

$$\int_{C_1} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^1 \vec{F}\gamma(t)\cdot\gamma'(t)dt = \int_0^1 \vec{F}\left(t,t^2\right)\cdot(1,2t)dt = \int_0^1 \left(t,t^4\right)\cdot(1,2t)dt =$$

$$= \int_0^1 \left(t + 2t^5\right)dt = \left[\frac{t^2}{2} + \frac{2t^6}{6}\right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}.$$

Também, temos que $C_2 : \gamma(t) = (1-t, 1-t)$, com $0 \le t \le 1$ donde $\gamma'(t) = (-1,-1)$. Então:

$$\int_{C_2} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^1 \vec{F}\gamma(t)\cdot\gamma'(t)\,dt = \int_0^1 \vec{F}(1-t,1-t)\cdot(-1,-1)\,dt =$$

$$= \int_0^1 \left(1-t,(1-t)^2\right)\cdot(-1,-1)\,dt = \int_0^1 \left(-1+t-1+2t-t^2\right)dt =$$

$$= \int_0^1 \left(-2+3t-t^2\right)dt = \left[-2t + \frac{3t^2}{2} - \frac{t^3}{3}\right]_0^1 = -2 + \frac{3}{2} - \frac{1}{3} = -\frac{5}{6}.$$

Logo:

$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \frac{5}{6} - \frac{5}{6} = 0.$$

Cálculo por teorema de Green

$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \iint_D (0-0)\, dxdy = \iint_D 0\, dxdy = 0$$

onde D é a região compacta do plano limitada por C.

Atenção: repare na simplicidade do cálculo da integral pelo teorema de Green!

Exercício 2: Utilize o teorema de Green para calcular:

a) $I = \oint_C -\frac{x^2y}{1+x^2}\, dx + \operatorname{arctg} x\, dy$ onde C é o caminho fechado formado por $y=0$, $x=1$, $y=1$ e $x=0$, no sentido anti-horário;

b) $I = \oint_C e^x \operatorname{sen} y\, dx + (x + e^x \cos y)\, dy$, onde C é a elipse $3x^2 + 8y^2 = 24$, no sentido anti-horário;

c) $I = \oint_C 2\operatorname{arctg}\frac{y}{x}\, dx + \left(\ln(x^2+y^2) + x\right) dy$ onde C é parametrizada por $x = 4 + 2\cos t$ e $y = 4 + \operatorname{sen} t$, com $0 \le t \le 2\pi$.

Solução:

a) O esboço da região D está representado na figura que se segue.





Seja D a região compacta de $\mathbb{R}^2$, limitada por C. Como $\partial D = C$ está orientada positivamente e $\vec{F}(x,y) = \Big(\underbrace{-\frac{x^2y}{1+x^2}}_{P}, \underbrace{\operatorname{arctg} x}_{Q}\Big)$ é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$, então podemos aplicar o teorema de Green:

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \iint_D \left[\frac{1}{1+x^2} - \left(-\frac{x^2}{1+x^2}\right)\right] dxdy =$$

$$= \iint_D \frac{1+x^2}{1+x^2}\, dxdy = \iint_D dxdy = A(D) = 1^2 = 1\,.$$

b) O esboço de $C: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{3} = 1$ está representado na figura a seguir.





Seja D a região compacta de $\mathbb{R}^2$, limitada por C. Como $C = \partial D$ está orientada positivamente e $\vec{F}(x,y) = (P,Q) = (e^x \operatorname{sen} y, x + e^x \cos y)$ é de classe C^1 no aberto $\mathbb{R}^2$, então pelo teorema de Green segue que

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \iint_D (1 + e^x \cos y - e^x \cos y)\, dxdy == \iint_D dxdy = A(D) = \pi ab$$

com $a = \sqrt{8}$ e $b = \sqrt{3}$. Então:

$$I = 2\sqrt{6}\,\pi\,.$$

c) De $x = 4 + 2\operatorname{sen} t$ e $y = 4 + \operatorname{sen} t$, com $0 \le t \le 2\pi$ temos $\left(\frac{x-4}{2}\right)^2 + (y-4)^2 = 1$. Logo, C é uma elipse fechada pois, $0 \le t \le 2\pi$, cujo esboço está representado na figura que se segue.





Seja D a região compacta limitada por C. Como $C = \partial D$ está orientada positivamente e $\vec{F}(x,y) = (P,Q) = \left(2\operatorname{arctg}\frac{y}{x}, \ln(x^2+y^2) + x\right)$ é de classe C^1 no conjunto aberto $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$ e $D \subset U$ então podemos aplicar o teorema de Green:

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \iint_D \left(\frac{2x}{x^2+y^2} + 1 - \frac{\frac{2}{x}}{1 + \frac{y^2}{x^2}}\right) dxdy =$$

$$= \iint_D \left(\frac{2x}{x^2+y^2} + 1 - \frac{2x}{x^2+y^2}\right) dxdy = \iint_D dxdy = A(D) = \pi ab$$

com $a = 2$ e $b = 1$. Logo, $I = 2\pi$.

Exercício 3: O teorema de Green pode ser utilizado para calcular a integral de linha

$$\oint_C \frac{-y}{x^2+y^2}\,dx + \frac{x}{x^2+y^2}\,dy$$

a) onde C é a circunferência $x^2 + y^2 = 1$, orientada no sentido anti-horário?

b) onde C é o triângulo com vértices $(1,0)$, $(1,2)$ e $(2,2)$, orientado no sentido anti-horário?

c) Qual é o valor da integral de linha onde C é o triângulo da parte (b)?

Solução:

a) O campo $\vec{F} = (P,Q) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$ é de classe C^1 no conjunto aberto $U = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$.



Como a região compacta D, limitada por C, contem a origem $(0,0)$, então D não está contida em U. Assim, não podemos aplicar o teorema de Green na região D.

b) O esboço do triângulo C está representado na figura que se segue.



Como a região compacta D, limitada por C, está contida em U, pois não contem $(0,0)$, então podemos aplicar o teorema de Green.

c) Pelo teorema de Green temos:

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$$

onde

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$
$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{x^2+y^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\,.$$

Logo:

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_D 0\; dxdy = 0\,.$$

Exercício 4: Use uma integral de linha para calcular a área da região plana limitada pelas curvas $y = x^2$ e $x = y^2$.

Solução: As interseções são $(0,0)$ e $(1,1)$. Então, o esboço da região está representado na figura a seguir.



Temos que $A(D) = \int_{\partial D^+} x\; dy$ onde $\partial D = C_1 \cup C_2$ com $C_1 : \gamma(t) = \left(t, t^2\right)$, com $0 \le t \le 1$ donde $\gamma'(t) = (1, 2t)$ e $C_2 : \gamma(t) = \left((1-t)^2, 1-t\right)$, com $0 \le t \le 1$ donde $\gamma'(t) = (-2(1-t), -1)$.

Atenção!

Aqui, usamos a parametrização: $\gamma(t) = \left((a+b-t)^2, a+b-t\right)$, com $0 \le t \le 1$ e com $a = 0$ e $b = 1$.

Outra alternativa seria parametrizar C_2^- (C_2 percorrida no sentido contrário), $C_2^- : \gamma(t) = \left(t^2, t\right)$, com $0 \le t \le 1$ e usar a propriedade

$$\int_{C_2} \vec{F}\cdot d\vec{r} = -\int_{C_2^-} \vec{F}\cdot d\vec{r}.$$

Voltando à solução temos:

$$A(D) = \int_{C_1} x\; dy + \int_{C_2} x\; dy$$

onde

$$\int_{C_1} x\,dy = \int_{C_1} 0\,dx + x\,dy = \int_0^1 \vec{F}\gamma(t)\cdot\gamma'(t)\,dt = \int_0^1 (0,t)\cdot(1,2t)\,dt =$$

$$= \int_0^1 2t^2\,dt = \left[\frac{2t^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

e

$$\int_{C_2} x\,dy = \int_{C_2} 0\,dx + x\,dy = \int_0^1 \vec{F}\gamma(t)\cdot\gamma'(t)\,dt =$$

$$= \int_0^1 \left(0,(1-t)^2\right)\cdot(-2(1-t),-1)\,dt = \int_0^1 -(1-t)^2\,dt = \frac{(1-t)^3}{3}\Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{3}(0-1) = -\frac{1}{3}\,.$$

Então:

$$A(D) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}\ u.a.$$

Exercício 5: Uma partícula move-se ao longo da circunferência $y = \sqrt{4-x^2}$ do ponto $(2,0)$ até $(-2,0)$. Determine o trabalho realizado nessa partícula pelo campo de força a seguir:

$$\vec{F}(x,y) = \left(x + e^{y^2}, x^3 + 3xy^2 + 2xye^{y^2}\right).$$

Solução: O esboço de C está representado na figura que se segue.



O trabalho realizado palo campo $\vec{F} = (P,Q) = \left(x + e^{y^2}, x^3 + 3xy^2 + 2xye^{y^2}\right)$ ao longo de C é dado por $W = \int_C \vec{F}\cdot d\vec{r}$.

Como

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 3x^2 + 3y^2 + 2ye^{y^2} - 2ye^{y^2} = 3x^2 + 3y^2 \neq 0$$

então $\vec{F}$ não é conservativo. Para calcular diretamente a integral é complicado, devido a complexidade do campo. Então consideremos a curva fechada $\overline{C} = C \cup C_1$, onde C_1 é o segmento de reta que liga $(-2,0)$ a $(2,0)$ e apliquemos o teorema de Green.



Seja D a região compacta limitada por $\overline{C}$. Como $\overline{C} = \partial D$ está orientada positivamente e $\vec{F}$ é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$ temos, pelo teorema de Green, que:

$$\oint_{\overline{C}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \iint_D \left(3x^2 + 3y^2\right) dxdy\,.$$

Cálculo de $\displaystyle\iint_D \left(3x^2 + 3y^2\right) dxdy$

Passando para coordenadas polares temos $x^2 + y^2 = r^2$, $dxdy = rdrd\theta$ e $D_{r\theta} : \begin{cases} 0 \le \theta \le \pi \\ 0 \le r \le 2 \end{cases}$. Logo:

$$\iint_D \left(3x^2 + 3y^2\right) dxdy = 3 \iint_D r^2 \cdot r \; drd\theta = 3 \int_0^{\pi} \int_0^2 r^3 \; drd\theta =$$
$$= 3 \int_0^{\pi} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^2 d\theta = 12 \int_0^{\pi} d\theta = 12\pi\,.$$

Cálculo de $\displaystyle\iint_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}$

Temos que $C_1 : \gamma(t) = (t, 0)$, com $-2 \le t \le 2$ donde $\gamma'(t) = (1, 0)$. Então:

$$\int_{C_1} \vec{F} \cdot \vec{r} = \int_{-2}^2 \vec{F}\gamma(t) \cdot \gamma'(t) \; dt = \int_{-2}^2 \vec{F}(t, 0) \cdot (1, 0) \; dt =$$
$$= \int_{-2}^2 \left(t + 1, t^3 + 0 + 0\right) \cdot (1, 0) \; dt = \int_{-2}^2 (t + 1) \; dt = \left[\frac{t^2}{2} + t\right]_{-2}^2 =$$
$$= (2 + 2) - (2 - 2) = 4\,.$$

Assim:

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 12\pi - 4 \; u.w.$$

Exercício 6: Mostre que

$$I = \int_{(0,1)}^{(2,3)} \left(2x + y^3\right) dx + \left(3xy^2 + 4\right) dy$$

é independente do caminho e calcule-a.

Solução: Seja $\vec{F}(x,y) = \left(2x + y^3\right)\ dx + \left(3xy^2 + 4\right)$ que é um campo de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$. Como $\mathbb{R}^2$ é um conjunto simplesmente conexo e $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = 3y^2$, então, pelo teorema das equivalências, segue que a integral I não depende do caminho que liga $(0,1)$ a $(2,3)$. Também, pelo teorema das equivalências, temos que $\vec{F}$ é um campo conservativo, isto é, existe uma função potencial $\varphi(x,y)$ tal que $\nabla\varphi = \vec{F}$ em $\mathbb{R}^2$ donde

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = 2x + y^3 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = 3xy^2 + 4 \quad (2)$$

Integrando (1) e (2) em relação a x e y, respectivamente, temos:

$$\varphi(x,y) = x^2 + xy^3 + f(y)$$

$$\varphi(x,y) = xy^3 + 4y + g(x)$$

Tomando $f(y) = 4y$ e $g(x) = x^2$ temos que:

$$\varphi(x,y) = x^2 + xy^3 + 4y\,.$$

Então, pelo teorema fundamental do cálculo para integrais de linha, temos:

$$I = \varphi(2,3) - \varphi(0,1) = \left(2^2 + 2\cdot 3^3 + 4\cdot 3\right) - (0 + 0 + 4) = 66\,.$$

Exercício 7:

a) Mostre que $I = \int_C \left(x + 3y + y^{10}\right) dx + \left(3x + 10xy^9 + \ln\left(1 + y^2\right)\right) dy$ é independente do caminho.

b) Calcule a integral I para $C : (x-1)^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, com $y \geq 0$, no sentido horário.

Solução:

a) Seja $\vec{F}(x,y) = (P,Q) = \left(x + 3y + y^{10}, 3x + 10xy^9 + \ln\left(1 + y^2\right)\right)$ de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$. Como $\mathbb{R}^2$ é um conjunto simplesmente conexo e $\frac{\partial Q}{\partial x} = 3 + 10y^9 = \frac{\partial P}{\partial y}$ então, pelo teorema das equivalências, segue que a integral de linha I é independente do caminho.

b) O esboço de C está representado na figura que se segue.



Como a integral I não depende da curva que liga $(0,0)$ a $(2,0)$, então consideremos outra curva no lugar de C. Seja, então, o segmento de reta C_1 ligando $(0,0)$ a $(2,0)$. Temos $C_1 : \begin{cases} x = t \\ t = 0 \end{cases}$, com $0 \leq t \leq 2$ donde $dx = dt$ e $dy = 0$. Então:

$$I = \int_{C_1} \left(x + 3y + y^{10}\right) dx + \left[3x + 10xy^9 \ln\left(1 + y^2\right)\right] dy =$$

$$= \int_0^2 (t + 0 + 0) dt = \int_0^2 t \, dt = \left[\frac{t^2}{2}\right]_0^2 = 2\,.$$

Exercício 8: Mostre que

$$I = \int_C (1 + 2xy + \ln x) \, dx + x^2 \, dy$$

é independente do caminho e calcule o valor de I onde C é dada por $\gamma(t) = (1 + \cos t, \operatorname{sen} t)$, com $-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$.

Solução: Seja $\vec{F}(x,y) = (P,Q) = \left(1 + 2xy + \ln x, x^2\right)$ que é de classe C^1 no conjunto aberto $U = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\right\}$.



Como U é um conjunto simplesmente conexo e $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = 2x = \dfrac{\partial P}{\partial y}$, então, pelo teorema das equivalências, segue que a integral de linha I é independente do caminho.

Esboço de C

Temos que $\gamma(-\pi/2) = (1,-1)$ e $\gamma(\pi/2) = (1,1)$. As equações de C são $x = 1 + \cos t$ e $y = \operatorname{sen} t$, com $-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$. Logo, $(x-1)^2 = \cos^2 t$ e $y^2 = \operatorname{sen}^2 t$ donde $(x-1)^2 + y^2 = 1$. Então C é o arco da circunferência $(x-1)^2 + y^2 = 1$, percorrido no sentido anti-horário que vai de $(1,-1)$ a $(1,1)$.



Como a integral de linha não depende do caminho então vamos substituir a curva C pelo segmento de reta C_1 que liga $(1,-1)$ a $(1,1)$.



Temos $C_1 : \begin{cases} x = 1 \\ y = t \end{cases}$, com $-1 \leq t \leq 1$ donde $dx = 0$ e $dy = dt$. Então:

$$I = \int_{C_1} (1 + 2xy + \ln x)\, dx + x^2\, dy = \int_{-1}^{1} 0 + 1^1\, dt = \int_{-1}^{1} dt = [t]_{-1}^{1} = 2\,.$$